

Svar på henvendelse vedr. terskelverdier fra Trondheim kommune ved Helse- og overdoseteamet

Det ligger i sakens natur at det er krevende, blant annet som følge av handlingenes ulovlighet samt forskningsetiske regler, å få sikker statistikk om omfanget og arten av bruk av illegale rusmidler i befolkningen. Utvalget anser det likevel vesentlig å forsøke å avklare følgende spørsmål for de mest vanlige illegale rusmidlene (eller grupper av rusmidler):

- Hvor mye utgjør en gjennomsnittlig brukerdose, og hvor stort er et realistisk spenn fra minste til største brukerdose mellom ulike brukere?

Heroin: 1/4 gram pr brukerdose til 1/8 gram

amfetamin: 1/4 gram pr brukerdose til 1/8 gram

Dolcontin: 200mg til 100mg

sobril/benzodiazepiner: 50mg til 5 mg

Xanor: 2 mg til 1 mg

cannabis: 1/4 gram

- Hvor mye utgjør vanlig forbruk i løpet av et døgn, og hvor stort er et realistisk spenn fra minste til største brukerdose mellom ulike brukere?

Heroin: 1 gram til 1/2 gram

amfetamin: 1 gram til 1/2 gram

sobril/benzodiazepiner: 200mg til 30mg

xanor: 10mg til 2 mg

cannabis: 1 gram

- Hvor mye utgjør et vanlig kjøp av stoffet til eget forbruk per kjøp, og hvor stort er et realistisk spenn fra minste til største brukerdose mellom ulike brukere?

Heroin: 400 kr

Amfetamin: 300 kr

sobril/benzodiazepiner: 100 kr

xanor: 2 mg 100kr 1 mg 50kr

cannabis: 50 kr 1/4 200 for 1 gram

Vi tar forbehold i forhold til tilgang/kvalitet og kvantum i forhold til kjøp for flere dager

- Reiser det aktuelle rusmiddelet særskilte utfordringer med tanke på å avklare på stedet (f.eks. for en politipatrulje) om et bestemt funn er ovenfor/under en gitt terskelverdi?

Hvordan bør det i så fall løses rent praksis?

Dette er noe vi ikke kan ta stilling til

De rusmidlene utvalget særlig har i tankene når det gjelder disse spesifikke spørsmålene er:

- Heroin

Heroin i Trondheim er veldig ustabil i forhold til renhetsgrad og tilgang. Sjeldent vanlig som førstevalg innen opioider