

Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden.

Gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, 12.11.2024

Innledning

I henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv (Blåreseptforskriften), ytes det stønad til vaksiner og immunglobulin mot hepatitt A og hepatitt B brukt pre- og posteksposisjonelt etter retningslinjer gitt av departementet. Stønadsordningen dekker ikke administrasjon av vaksiner og oppfølging med blodprøvekontroll.

Insidensen av hepatitt A og B er lav i Norge. Vaksiner og immunglobulin mot hepatitt A og hepatitt B på blåresept skal bare tilbys personer som er særlig utsatt for smitte. Valget av gruppene bygger på kunnskap om virusets smittemåter, utbredelsen av hepatitt A og B i Norge og mulighetene for å bli eksponert.

Denne retningslinjen erstatter retningslinjene gitt 1. juni 2011 i rundskriv I-2/2011 ”*Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden*”.

Retningslinjene fokuserer nå kun på hvilke målgrupper som har rett på stønad til vaksiner og immunglobulin gjennom blåreseptordningen. For nærmere omtale av smittevern mot hepatitt A og B, inkludert immunisering, henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no), Smittevernhåndboka og Vaksinasjonshåndboka. Utleveringsbestemmelser framgår av forskriften.

Målgrupper som får stønad til preekssponeringsimmunisering

Tabell 1. Målgrupper som får preekssponeringsprofylakse med hepatitt A- og/eller hepatitt B-vaksine dekket av Folketrygden.

Målgruppe	Hepatitt A	Hepatitt B
<i>A) Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere</i>		
Medlemmer av samme husstand som kroniske smittebærere		✓
Seksualpartnere til kroniske smittebærere		✓
Beboere i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede kroniske smittebærere		✓
<i>B) Personer særlig utsatt for smitte</i>		
Personer med rusmiddelavhengighet (særlig personer som injiserer eller sniffer rusmidler)	✓	✓
Menn som har sex med menn		✓
Transpersoner		✓
Personer som selger seksuelle tjenester		✓
<i>C) Personer med utenlandsk bakgrunn</i>		
Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område		✓
<i>D) Personer med visse sykdommer eller -tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A og/eller hepatitt B eller konsekvenser av hepatitt A og/eller hepatitt B</i>		
Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter	✓	✓
Pasienter som har kronisk leversykdom	✓	✓
Pasienter som har kronisk nyresvikt		✓
Personer med Downs syndrom		✓
<i>E) Personer som utsettes for smittefare under utdanning i Norge</i>		
Studenter i medisin, odontologi, tannpleie, bioingeniørfag og sykepleie (grunnutdanning, og videreutdanning i operasjonssykepleie, anesthesisykepleie, intensivsykepleie og jordmorfag)		✓
Studenter under utdanning til ambulansarbeider, helsesekretær, politiaspirant, fengselsbetjent og paramedisin		✓
<i>F) Særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge</i>		
Målgruppen for vaksinasjon bestemmes av smittevernansvarlig kommunelege i samarbeid med Folkehelseinstituttet	✓	

Målgrupper som får stønad til posteksponeringsimmunisering

Posteksponeringsprofylakse med vaksine og evt. immunglobulin er aktuelt etter sannsynlig eksponering for hepatitt A- eller B-virus. Med sannsynlig eksponering menes en hendelse som kan føre til smitte, dvs. at viruset er til stede/sannsynligvis til stede, viruset har en smittevei og inngangsport, og den eksponerte ikke er kjent immun. Mer informasjon om medisinskfaglige vurderinger om eksponering og anbefalt posteksponeringsprofylakse finnes på Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no - Smittevernhandboka og Vaksinasjonshandboka).

Eksempler på eksponeringer som kan føre til smitte:

- Nyfødte barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon.
- Personer utsatt for stikkuehell med sprøyte eller annen blod-/seksuell- eksponering for hepatitt B. Se kapitelet 'Stikkuehell på sprøyter og andre blodeksponeringer' i Folkehelseinstituttets Smittevernhandbok.
- Husstandsmedlemmer og seksualpartnere til pasienter med hepatitt A og eventuelt andre nærkontakter som har spist mat som pasienter har håndtert.
- Ansatte og barn i barnehager med et tilfelle av hepatitt A.
- Nærkontakter til indekspasienter ved hepatitt A-utbrudd i skoler, fengsler eller helseinstitusjoner dersom overføring av hepatitt A-virus i skolen, fengselet eller institusjonen er dokumentert.